

05.05.2010

**Hallintovaliokunta  
Eduskunta**

Viite Pyyntö tilastotiedoista kuulemistilaisuudessa ampuma-aselakiesityksestä (HE 106/2009 vp)

**TILASTOTIETOA AMPUMA-ASEISTA**

Hallintovaliokunnassa tiedusteltiin keväällä 2010, onko tietoa ampuma-aselainsäädännön ja itsemurhien määrän välisestä mahdollisesta yhteydestä, ja mitkä ovat itsemurhien tekotavat Suomessa.

Ampuma-aselainsäädännön vaikutuksesta ampumalla itsemurhan tehneiden määrään on selvitetty muutamassa tieteellisessä julkaisussa. Tuorein niistä on toukokuussa 2010 julkaistu Florentine JB and Crane C: Suicide prevention by limiting access to methods (Soc Sci Med 2010;70:1626). Kyseessä on meta-analyysi julkaistuista artikkeleista. Sen perusteella voidaan sanoa, että ampuma-aseiden saannin rajoittaminen mm. lainsäädäntöteitse merkitsevästi alentaa suisidiriskiä näillä tekotavoilla. Artikkelissa on useita viitteitä eri lähteisiin joissa asiaa on selvitetty, pääasiassa Kanadassa ja USA:ssa.

Tilastokeskuksen tietojen mukaan Suomessa tapahtui v. 2008 1510 itsemurhaksi luokiteltua kuolemaa. Eri tekotavoista laskettuna tavallisin itsemurhamenetelmä oli hirttäytyminen (40.7 % tapauksista), ja ampuma-aseella tehty itsemurha oli seuraavaksi yleisin menetelmä (27.3 %). Ampumalla itsemurhan tehneistä nuorimmat olivat ikäryhmässä 15 -19 vuotta, aseina sekä käsiaseet että kiväärit/haulikot). Muut tekotavat olivat selvästi harvinaisempia (jättäytyminen liikkuvan esineen alle 8.6 %, korkealta hyppääminen 8.3 % ja hukuttautuminen 6.5 %).

Ylilääkäri

Tom Silfvast

